

**CURAME® 25 WG**

(microgranuli idrodispersibili)

**Antiperonosporico per la difesa della vite e di altre colture orticole e industriali**

CURAME 25 WG - Registrazione Ministero della Salute n. 13150 del 03/03/2006

**COMPOSIZIONE**

CIMOXANIL puro	g.	4,0
RAME metallico	g.	25,0
(sotto forma di ossicloruro di rame)		
Coformulanti	q.b. a	g.100

Partita n.

Contenuto: 50-100-250-500 g 1-2-5-10-25 Kg

**PERICOLO****MANICA SpA**

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Tel. 0464 433705

Stabilimenti di produzione:

**KING TECH CORPORATION** - XinShi, Fengxian – Shanghai (Cina)**MANICA SpA** – Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H318 Prova gravi lesioni oculari. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**PREVENZIONE:** P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. **REAZIONE:** P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione o di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. **SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH 208 Contiene cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante le fasi di miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare indumenti da lavoro e guanti protettivi. Data la classificazione del prodotto indossare una protezione per viso/occhi quando si maneggia il concentrato. Rispettare una fascia di vegetazione non trattata di 10 metri quando si applica il prodotto su melone e cucurbitacee per proteggere i residenti/astanti. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Durante le ispezioni in campo indossare abiti da lavoro. Durante le attività di mantenimento, che potranno essere iniziate solo a 33 giorni dall'ultimo trattamento per la vite, indossare sempre indumenti da lavoro e guanti. Durante le attività di raccolta indossare sempre indumenti da lavoro e guanti.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per gli usi su pomodoro e cucurbitacee.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali per gli usi su vite.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CIMOXANIL 4% e RAME 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**CIMOXANIL** - Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.**RAME** - Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: sintomatica

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

**CARATTERISTICHE**

CURAME 25 WG è un fungicida in microgranuli idrodispersibili, efficace contro la Peronospora e altre malattie fungine che colpiscono vite, pomodoro, melone e cetriolo. CURAME 25 WG è una miscela di due principi attivi, di cui l'ossicloruro di rame possiede azione preventiva e lunga persistenza, mentre il cimoxanil ha prontezza d'azione ed effetto curativo, in quanto penetra nelle foglie.

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**

Non effettuare più di 5 trattamenti all'anno.

CURAME 25 WG va impiegato seguendo i normali calendari di lotta a seconda delle condizioni di temperatura e di umidità (in caso di stagione particolarmente piovosa andranno impiegate le dosi maggiori riducendo l'intervallo di tempo fra un trattamento e l'altro). Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti a volume normale (1000 l/ha su vite e 500-800 l/ha su orticole). In caso di utilizzo di volumi superiori o inferiori a quelli indicati, adattare le dosi/ha per rispettare la dose ad ettaro indicata.

Coltura	Avversità	Epoche d'impiego	Dosi d'impiego	Dosi/ha	N° max trattamenti anno	Intervallo tra i trattamenti (gg)
VITE	Peronospora ( <i>Plasmopara viticola</i> )	-trattamenti pre-fiorali -trattamenti post-fiorali -trattamenti di "chiusura"	250-300gr/hl 250-300gr/hl 250-300gr/hl	2,50-3,0Kg	4	8-10
POMODORO (in campo)	Peronospora ( <i>Phytophthora</i> spp.)	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	280-600gr/hl	2,25-3,0Kg	5	8-10
CUCURBITACEE (cetriolo e melone) (in campo)	Peronospora ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )		280-600gr/hl	2,25-3,0Kg	4	8-10

Al fine di ridurre al minimo il potenziale accumulo nel suolo e l'esposizione per gli organismi non bersaglio, tenendo conto al contempo delle condizioni agroclimatiche, non superare l'applicazione cumulativa di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. Si raccomanda di rispettare il quantitativo medio applicato di 4 kg di rame per ettaro all'anno

**COMPATIBILITÀ**

CURAME 25 WG può essere miscelato a tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia l'impiego del prodotto in miscela con prodotti a reazione alcalina.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

**AVVERTENZA:** In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**GESTIONE DELLE RESISTENZE:** Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare CURAME 25 WG ad altri fungicidi.

**FITOTOSSICITÀ** - Non trattare durante la fioritura.

**Sospendere i trattamenti 33 giorni prima della raccolta per vite, 10 giorni per le altre colture.**

**ATTENZIONE**

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.**

**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.**

**Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

# CURAME® 25 WG

(microgranuli idrodispersibili)

**Antiperonosporico per la difesa della vite e di altre colture orticole e industriali**

CURAME 25 WG - Registrazione Ministero della Salute n. 13150 del 03/03/2006

**COMPOSIZIONE**

CIMOXANIL puro	g. 4,0
RAME metallico	g. 25,0
(sotto forma di ossicloruro di rame)	
Coformulanti q.b. a	g.100

Partita n.

Contenuto: 50-100g



**PERICOLO**

## MANICA SpA

Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Tel. 0464 433705

Stabilimenti di produzione:

KING TECH CORPORATION - XinShi, Fengxian - Shangai (Cina)

MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H318 Prova gravi lesioni oculari. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**PREVENZIONE:** P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. **REAZIONE:** P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P333 +P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione o di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P391 Raccogliere la fuoriuscita. **SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH 208 Contiene cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO**

**NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**