

PRODOTTO

Presentazione: Soluzione Liquida (SL)
Densità: 1,4
pH: 8,20 (soluzione 1%)

PACKAGING

1 L
20 L
5 L

SPECIFICHE TECNICHE

Ossido di Magnesio (MgO) solubile in acqua: 10% p/p (140 g/L)
Azoto (N) nitrato: 7% p/p (98 g/L)
Boro (B): 0,25% p/p (3,6 g/L)
Ferro (Fe) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,05% p/p (0,7 g/L)
Manganese (Mn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,05% p/p (0,7 g/L)
Zinco (Zn) solubile in acqua, chelato EDTA: 0,02% p/p (0,3 g/L)
Molibdeno (Mo): 0,001% p/p (0,014 g/L)

PRINCIPALI BENEFICI

Velocità massima e grande efficienza
nel correggere le carenze e gli squilibri
nell'assimilazione di magnesio

Contiene boro, molibdeno e ferro chelato
EDTA, manganese e zinco per stimolare i
processi metabolici delle piante

Contiene Azoto che migliora la penetrazione
e l'uso di magnesio

Compatibile con il nitrato di calcio



Stimolazione dell'attività fotosintetica e
della produzione di clorofilla

Efficiente prevenzione delle carenze di
magnesio nelle colture, garantendo la
migliore qualità (formazione della proteina
di sintesi e zucchero) e la resa dei raccolti

Speciale formulazione di Tradecorp
per favorire l'assorbimento fogliare di
magnesio ed il suo trasporto all'interno
della pianta

DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE FOGLIARE

Nel caso di miscele complesse e applicatori a bassi volumi, effettuare saggi preliminari
Per il corretto posizionamento, dosaggio e miscelazione del prodotto, rivolgersi a personale tecnico specializzato

Vite	3-5 L/ha	3-4 applicazioni dall'inizio della crescita vegetativa fino all'inizio della invasiatura. Raccomandato specialmente per prevenire la fisiopatia "disseccamento del rachide".
Alberi da frutto, olivi, agrumi	3-5 L/ha	Applicare prima della fioritura e poi 4-6 applicazioni con 2-4 L/ha, ogni 10-15 giorni, iniziando alla caduta petali fino a un mese prima della raccolta
Patate	3-5 L/ha	3-4 applicazioni ogni 10-15 giorni, da quando la coltura è alta 15-20 cm (inizio formazione dei tuberi)
Colture orticole (pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, carciofi, etc...)	2-4 L/ha (200-400 ml/h)	3 applicazioni, quando vi è sufficiente fogliame e con intervallo di 7-14 giorni
Meloni, cocomeri cucurbitacee in genere	2-4 L/ha	Quando la coltura ha 4-6 foglie; ripetere con 2-3 L/ha durante la comparsa del frutto
Melone, anguria, cucurbitacee	2-4 L/ha 2-3 L/ha	Applicare quando il raccolto ha 4-6 foglie Applicare durante la prima apparizione del frutto
Lattuga, indivia, scarole	2-4 L/ha	3 applicazioni, quando vi è sufficiente fogliame ogni 7-14 giorni
Fragole	2-4 L/ha	Applicare allo stadio bottoni fiorali verdi e poi 2-4 L/ha alla caduta petali
Cereali, leguminose, colture industriali	3-5 L/ha	Applicare quando il raccolto ha 4-8 foglie

APPLICAZIONE AL SUOLO

Tutte le colture	10-15 L/ha	Applicare ogni 10-12 giorni Aggiungere nel serbatoio dei nitrati
------------------	------------	---